

# OXAL<sup>®</sup>

Quinfamida, Albendazol

## PARASITOSIS INTESTINAL

La parasitosis intestinal es un problema de salud en México por la gran variedad de parásitos que existen y por los efectos nocivos que éstos ocasionan en la población.

### 1.- ¿Qué parásitos intestinales son más frecuentes?

Las Lombrices (helminths) que generalmente se pueden ver a simple vista y las Amibas (protozoarios) que solo se detectan con estudios de laboratorio.



La Amiba y la Lombriz son parásitos, pero no son iguales.

La Amiba es tan frecuente como la Lombriz y en muchas ocasiones se encuentran juntas en el intestino por lo que se requiere un tratamiento completo que las elimine y no utilizar tratamientos para cada una.



Tanto la Amiba como la Lombriz pueden no ocasionar síntomas como falta de apetito, palidez, comezón anal y gases.

2.- OXAL<sup>®</sup> es un tratamiento para eliminar tanto Lombrices como Amibas, en una toma, en un día.

## Indicaciones Higiénico-dietéticas:

Lavarse las manos antes de comer, cocinar y después de ir al baño.

Hervir el agua para beber.

Cocer muy bien los alimentos.

Evitar comer alimentos en la calle.

Se recomienda desparasitar a toda la familia al mismo tiempo.

No ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes y 24 horas después de tomar OXAL<sup>®</sup>.

# OXAL<sup>®</sup>

Quinfamida, Albendazol

OXAL<sup>®</sup> es un tratamiento para eliminar tanto Lombrices como Amibas, en una toma, en un día.

OXAL<sup>®</sup> elimina las Lombrices y Amibas de toda la familia "con una sola toma".

OXAL<sup>®</sup> tabletas no se recomienda en niños menores de 12 años.

OXAL<sup>®</sup> no se recomienda en mujeres embarazadas o durante la lactancia.

**Instrucciones para su uso:** Adultos y niños mayores de 12 años, deben tomar 2 tabletas de OXAL<sup>®</sup> al mismo tiempo. OXAL<sup>®</sup> no requiere un horario específico para su administración. OXAL<sup>®</sup> puede ser administrado con o sin alimentos.

#### Reacciones adversas frecuentes:

El uso de OXAL<sup>®</sup> puede producir dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y vértigo.

#### Interacciones medicamentosas:

No conocidas a la fecha. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

**Precauciones y contraindicaciones:** No use OXAL<sup>®</sup> durante el embarazo y lactancia. El empleo de este medicamento durante el embarazo queda bajo responsabilidad del médico. No use OXAL<sup>®</sup> si es hipersensible a los componentes de la fórmula, tiene amibiasis extraintestinal o disentería amibiana severa. OXAL<sup>®</sup> tabletas no debe usarse en niños menores de 12 años. OXAL<sup>®</sup> no se recomienda en mujeres embarazadas o durante la lactancia.



More Pharma Corporation, S. de R.L. de C.V.



**Adultos**  
y niños mayores  
de 12 años

**OXAL<sup>®</sup>**  
es un tratamiento  
recomendado  
para toda la  
familia que  
elimina tanto  
**Lombrices como**  
**Amibas** en una  
sola toma.

• Amibas

• Giardias

• Lombrices

