

OXAL[®]

Quinfamida, Albendazol

PARASITOSIS INTESTINAL

La parasitosis intestinal es un problema de salud en México por la gran variedad de parásitos que existen y por los efectos nocivos que éstos ocasionan en la población.


1.- ¿Qué parásitos intestinales son más frecuentes?

Las Lombrices (helmintos) que generalmente se pueden ver a simple vista y las Amibas (protozoarios) que solo se detectan con estudios de laboratorio.



La Amiba y la Lombriz son parásitos, pero no son iguales.

La Amiba es tan frecuente como la Lombriz y en muchas ocasiones se encuentran juntas en el intestino por lo que se requiere un tratamiento completo que las elimine y no utilizar tratamientos para cada una.



Tanto la Amiba como la Lombriz pueden no ocasionar síntomas como falta de apetito, palidez, comezón anal y gases.

2.- OXAL[®] es un tratamiento para eliminar tanto Lombrices como Amibas, en una toma, en un día.

Indicaciones Higiénico-dietéticas:

Lavarse las manos antes de comer, cocinar y después de ir al baño.

Hervir el agua para beber.

Cocer muy bien los alimentos.

Evitar comer alimentos en la calle.

Se recomienda desparasitar a toda la familia al mismo tiempo.

No ingerir bebidas alcohólicas 24 horas antes y 24 horas después de tomar OXAL[®].

OXAL[®]

Quinfamida, Albendazol

Infantil JUNIOR

OXAL[®] es un tratamiento que elimina tanto Lombrices como Amibas en una sola toma.

• Amibas

• Lombrices

OXAL[®] es un tratamiento para eliminar tanto Lombrices como Amibas, en una toma en un día.

OXAL[®] elimina las Lombrices y Amibas de toda la familia "con una sola toma".

OXAL[®] Infantil suspensión no se recomienda en niños menores de 2 años.

OXAL[®] no se recomienda en mujeres embarazadas o durante la lactancia.

Instrucciones para su uso: Niños de 2 a 6 años, deben tomar 10 mL de OXAL[®] Infantil suspensión en una sola toma. Niños de 7 a 11 años, deben tomar 20 mL de OXAL[®] Junior suspensión en una sola toma. OXAL[®] no requiere un horario específico para su administración. OXAL[®] puede ser administrado con o sin alimentos.

Reacciones adversas frecuentes:

El uso de OXAL[®] puede producir dolor de cabeza, dolor abdominal, náuseas y vértigo.

Interacciones medicamentosas:

No conocidas a la fecha. Si tiene alguna duda, consulte a su médico.

Precauciones y contraindicaciones: No use OXAL[®] durante el embarazo y lactancia. El empleo de este medicamento durante el embarazo queda bajo responsabilidad del médico. No use OXAL[®] si es hipersensible a los componentes de la fórmula, tiene amebiasis extraintestinal o disentería amebiana severa. OXAL[®] Infantil suspensión no se recomienda en niños menores de 2 años. OXAL[®] no se recomienda en mujeres embarazadas o durante la lactancia.



More Pharma Corporation, S. de R.L. de C.V.



4208-007-E